

## अमेरिकन फौजी किरा र यसको व्यवस्थापन

सम्पूर्ण मकै लगाउने कृषकहरूको लागि अनुरोध ।

मकै वालीमा भर्खरै उम्रिएका देखि घुँडाको उचाइ सम्म आएका सबै अबस्थाका बोटहरूमा अमेरिकन फौजी किरा र फाटफुट गवारो किराको आक्रमण देखा पर्न थालेको छ। तपाईंहरूको खेतबारीमा फौजीकीरा लागेको कसरी थाहा पाउने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नु बारेमा जानकारी गराउन चाहान्छौं। निम्न कुराहरू खेतबारीमा अबलोकन गर्दा देखिएमा तपाईंको मकैवालीमा फौजीकीरा लागेको पक्का हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।

- खेतबारीको नियमित अबलोकन गर्दा यदि पातमा सेता धब्बाहरू देखिएमा र पातको हरीयो भाग खाएको पाइएमा यो फौजीकीराको क्षति सुरु भयो भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ । सुरुका मसीना लार्भाहरूले पातको हरीया भागहरू कोत्रेर खाने गर्दछन ।
- पातको तल्लो पट्टि वा माथील्लो भागमा नियालेर हेर्दा अन्डाहरू देखिएमा पनि यो फौजीकीरा लागेको थाहा हुन्छ ।
- ठुला कीराहरूले पात, गुभो खाएको स्पष्ट देखिन्छ, साथै प्रसस्त किराको दिसाहरू पनि देखिन्छ ।
- लार्भालाई निकालेर हेर्दा पछाडीको खन्डमा चित्रमा देखिएको जस्तो बर्गाकार ४ वटा थोप्लाहरू देखिएमा यो फौजीकीराको लार्भा हो भनेर एकीन गर्न सकिन्छ ।
- लार्भाले विरुवाको नरम भागहरू खाएर बोटलाई हानि पुऱ्याउँछ। लार्भाको शरिरमा माथि देखि तलसम्म फिक्का पट्टि देखिन्छ र टाउको गाढा रंगको हुन्छ । लार्भाको कालो टाउकोमा फिक्का, उल्टो Y आकारको पट्टिहरू देखिन्छ । लार्भाको शरीरको आठौं खण्डमा चार गाढा थोप्लाहरू हुन्छन । जब लार्भा परिपक्व हुन्छ, त्यसको शरीरको रंग हल्का हरियो बाट गाढा खैरोमा परिवर्तन हुन्छ। (फोटोहरू तल हेर्नुहोस्।)
- दिउँसोको समयमा गुभो नियालेर हेर्दा माउहरू पनि लुकेर बसेको देखिन्छ ।

### यसको व्यवस्थापन विधिहरू

- खेतबारीको नियमित अबलोकन गरी, अन्डाहरू संकलन गरी नष्ट गर्ने । यसो गर्दा अन्डाहरूबाट लार्भा निस्कन पाउदैनन र संख्या घटन जान्छ ।
- खेतबारी वरीपरी सरसफाई राख्नाले यो कीरा लुकेर बस्न पाउदैन ।
- खेतबारीमा रासायनिक मल सिफारीस मात्रामा राख्ने ।
- बीउ उपचार गरेर रोपेमा बोट ३, ४ पातहुँदा सम्म यो कीरा लाग्न सक्दैन । बीउ उपचारको लागि जस्तै इमीडाक्लोरोपीड ४८% यफ.यस. नामक बिषादी ४ एम.एल. प्रति किलोग्राम बिउका दरले उपचार गरि छर्ने ।

- पातमा मसीनो कीरा देखीनासाथ बजारमा उपलब्ध भएका नीमजन्य विषादी हालेर यो कीरा समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
- गाउँघरमा पाइने जडीबुटीहरू जस्तै निम, बकाइनो, तितेपाती, खुर्सानी, असुरो आदी मिसाएर गाइको पिसाबमा पकाउने र आएको रसमा १ भाग रसमा १० भाग पानी मिसाएर टंकीको सहायताले पुरै बोट, गुभो भिज्ने गरी छर्ने, यो ६, ७ दिनको फरकमा पुन छर्ने ।
- ठुला कीराको लागी गाउँघरमा पाइने खरानी वा काठको धुलो वा मसीनो माटो मकैको गुभोमा थोरै थोरै राखीदिनाले पनि किराहरू मर्दछन ।
- यदि यसो गर्दा पनि कीराको प्रकोप देखिएमा बजारमा उपलब्ध हुने सुरक्षीत विषादि छर्नु पर्दछ । विषादीमा स्पाइनोस्याड ०.३ एम.एल. प्रती लिटर पानी वा क्लोरान्टानीलीप्रोल ०.४ एम.एल. वा स्पाइनेटोराम ०.४ एम.एल. वा इमामेक्टीन बेन्जोएट ०.४ ग्राम प्रती लिटर पानीमा राखेर कुनै एक विषादी पुरै पात गुभो भिज्ने गरी छर्ने । दोश्रो पटक छर्न परेमा पहिला छरेको विषादी नभै माथी सिफारिस गरिएका कुनै एक विषादी छर्ने किनकी लगातार एउटै बषादी छर्दा कीराले विषादी पचाउन सक्ने भएकाले काम नगर्न पनि सक्छ । विषादी छर्दा बेलुका २, ३ बजेतीर छर्नु पर्दछ । । किरा लागेका बोटहरूको गुबोमा पर्ने गरि विषादी छर्ने ।



थप जानकारीको लागि:

सरिता सापकोटा

बा.स.अ.सातौं

९८४९०३५९८२